

Tiarella cordifolia

Norsk navn: Klaseskumblom

Latinsk navn: Tiarella cordifolia

Plantegruppe: NS 4405 Stauder

Type:

Høyde: 0.3 m

Blomsterfarge: Kvit, kremfarga

Bladverk: Grønt

Våre erfaringer:

Utfolder seg best i ei humusrik jord i lett skygge. I et svalere kystklima kan den tåle full sol dersom jordtypen er god. Bladverket danner etter hvert et tett bunndekke, hvite blomster på forsommeren. Den krypende jordstokken planten har gjør at den etablerer bunndekke forholdsvis raskt. Egner seg derfor best i større felt mellom eller under annen vegetasjon.

Blomstringstid:

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |

Hardførhet:

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| H7 | H8 | | | | |

Høstfarger: Lysforhold:

| | | | | |
|----|-----|-----|---------------|--------|
| Ja | Nei | Sol | Delvis Skygge | Skygge |
|----|-----|-----|---------------|--------|

Beskjæringstidspunkt:

| | | | |
|-----|------|--------|--------|
| Vår | Høst | Vinter | Sommer |
|-----|------|--------|--------|

Vekstforhold:

| Tåler | Dårlig | Middels | Godt |
|-------------------|--------|---------|------|
| Tunge jordarter | | | |
| Tørr sandjord | | | |
| Kalkholdig jord | | | |
| Sur jord | | | |
| Fuktig vokseplass | | | |
| Vind | | | |
| Salt | | | |